

CLAVE DEL PRODUCTO: 9050

GENERALIDADES

Comercializador: Tecnobotánica de México
Tipo de documento: Ficha técnica
Fecha de elaboración del documento: 2018-11-23

Imagen del producto:



Clave del producto: 9050
Número de código de barras del producto: 7501600190502
Denominación del producto: CORTEZA DE CUACHALALATE
Marca: BIOCUCUACHALALATE ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA DIGESTIVO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 180 grs.
Unidad de medida: 6,34 oz.
Estado físico: Té
Contenido neto por cada dosis: NO APLICA
Vía de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL
Instrucciones para su uso consumo: TOMAR UN (1) TAZA ANTES DE LOS ALIMENTOS 3 VECES AL DIA.
Instrucciones para su preparación: 1.-AGREGAR EN UN LITRO DE AGUA DOS CUCHARADAS SOPERAS DEL PRODUCTO Y DEJESE HERVIR A FUEGO LENTO<
Precauciones: MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERIAN CONSULTAR A UN MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO, NO
Necesidades de refrigeración: NO
Instrucciones para su conservación: GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
Clave de producto SAT: 51191900
Unidad de medida SAT: CTG

INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por porción:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario		Envase Secundario	
Descripción:	BOLSA	Descripción:	CAJA
Dimensiones del envase:		Dimensiones del envase:	
Alto:	15.5 CM	Alto:	13.5 CM
Ancho:	4.5 CM	Ancho:	4.5 CM
Largo:	8 CM	Largo:	9.5 CM
Peso:	0.005 G	Peso:	0.020 G
Número de rosca de la tapa:	NO APLICA	Material del envase:	CARTULINA SULFATADA
Material del envase:	POLIPROPILENO	Especificaciones del holograma:	HOLOGRAMA DE 15 MM TECNO BOTANICA
Color del envase:	NATURAL		
Color de la tapa:	NO APLICA		
Otros componentes:	NO APLICA		
Arte de la etiqueta:			

BioCUACHALALATE®

Tea * Té

Ingredient:
CUACHALALATE-BARK
(*Amphipterygium adstringens* Schiede
ex Schlecht).

Directions for Use: As a herbal dietary supplement take one (1) cup 1 hr before meals.
Do not take this supplement within one hour of taking medications.
Do not exceed the recommend dosage.

WARNING: Women who are pregnant or lactating, and anyone taking medications or other dietary supplements, should consult a health care professional before using any nutritional product.
If any adverse reactions occur, discontinue use and consult a health care professional.

Food supplements should not be used instead of a varied diet.

Storage: Keep tightly closed in dry place; do not expose to excessive heat.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Store in a cool, dry place. Do not use if the bag has been opened.

MADE IN MEXICO

Instructions to Preparation:
THE TEA IS A VERY EASY WAY TO USE THE HERBS.
EL TÉ ES UNA FORMA MUY SENCILLA EMPLEAR LAS HERBAS.

**RIGHT BEFORE BOILING BREAKS ADD TWO SPOONFUL OF THE HERB COMPOUND INTO 1/2 CUP(S) AND LET SOAK AND STEEP AT A LOW FIRE FOR 10 MINUTES.
JUSTO ANTES DE QUE HIERVA EL AGUA SE AÑADE UNA A UN LITRO DOS CUCHARADAS SOPERAS DEL PRODUCTO Y DEBE SE HERRVIR A PUEBOLLENTO 10 MINUTOS.**

**NEXT, USE A STRAINER OVER A PITCHER OR CUP OF TEA.
A CONTINUACIÓN SE QUELACION UN COLADOR COLCOCADO SOBRE UNA JARRA O UNA TAZA DE TÉ.**

PACKING / EMPACADO POR:
FITOCÉUTICOS®, S.A. DE C.V.
La granja con Camino a San Antonio Ocotlán, C.P. 73080, Xicotepec de Juárez, Pue.

Peso unitario del producto terminado en gramos: 0.200 g

Empaque colectivo	
Cantidad de piezas por empaque colectivo:	88 PZ
Descripción del empaque colectivo:	CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto:	34.5 CM
Ancho:	30.5 CM
Largo:	59.5 CM
Peso:	0.975 G
Arte del empaque:	NO APLICA
Material del envase:	CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto:	18.580 kg

INGREDIENTES

Ingredientes:

CUACHALALATE-CORTEZA (*Amphipterygium adstringens*
Schiede ex Schlech.)

Información de los principales ingredientes:

Las úlceras pépticas son llagas abiertas que se desarrollan en el revestimiento interno del estómago y la parte superior del intestino delgado. El síntoma más frecuente de una úlcera péptica es el dolor estomacal. Las úlceras pépticas incluyen las siguientes: Las úlceras pépticas, que ocurren en el interior del estómago. Las úlceras duodenales, que ocurren en el interior de la parte superior del intestino delgado (duodeno)

Las causas más frecuentes de las úlceras pépticas son infección por la bacteria *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) y el uso prolongado de la aspirina y otros analgésicos, como el ibuprofeno (Advil, Motrin, otros) y el naproxeno sódico (Aleve, Anaprox, otros). El estrés y los alimentos picantes no provocan úlceras pépticas. Sin embargo, pueden hacer que los síntomas empeoren.

El síntoma más frecuente de la úlcera péptica es el dolor por ardor estomacal. Los ácidos del estómago hacen que el dolor sea peor, como sucede cuando tienes el estómago vacío. El dolor muchas veces se puede aliviar con ciertos alimentos que controlan la acidez de tu estómago o con ciertos medicamentos que reducen la acidez, pero luego puede volver. El dolor puede ser peor entre las comidas y a la noche. Cerca del 75 % de las personas con úlceras pépticas no tienen síntomas.

Las úlceras pépticas se producen cuando el ácido en el tubo digestivo se consume en la superficie interna del estómago o del intestino delgado. El ácido puede crear una llaga dolorosa que puede sangrar. El tubo digestivo está recubierto con una capa mucosa que generalmente protege contra el ácido. Sin embargo, si la cantidad de ácido aumenta o la cantidad de mucosidad disminuye, podrías desarrollar una úlcera. Las causas más frecuentes incluyen lo siguiente: Una bacteria.

La bacteria *Helicobacter pylori* vive con frecuencia en la capa mucosa que cubre y protege los tejidos que recubren el estómago y el intestino delgado. A menudo, la bacteria *H. pylori* no causa problemas, pero puede provocar la inflamación de la capa interna del estómago y producir una úlcera. No está claro cómo se propaga la infección por *H. pylori*. Es posible que se transmita de una persona a otra mediante un contacto cercano, como besar. Las personas también pueden contraer *H. pylori* a través de los alimentos y el agua.

Uso habitual de ciertos analgésicos. Tomar una aspirina, así como también varios analgésicos de venta libre o con receta, llamados medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, puede irritar e inflamar la capa del estómago y el intestino delgado. Estos medicamentos incluyen ibuprofeno (Advil, Motrin IB, otros) y naproxeno sódico (Aleve, Anaprox, otros), pero sin paracetamol (Tylenol).

Las úlceras pépticas son más frecuentes en los adultos mayores que toman estos medicamentos para el dolor con frecuencia o en personas que toman estos medicamentos para la osteoartritis.

El "CUACHALALATE" (*Juliana adstringens* Seh) es uno de los árboles más comunes de la zona centro y sur de México. Hay una larga tradición de consumo de sus propiedades desde la época prehispánica, por sus poderes para aliviar el principalmente el estómago. Estas cualidades paulatinamente van comprobándose con la ciencia. No solo es un aliciente ideal para la gastritis, también es un efectivo anticancerígeno.

Tiene un poderoso efecto sobre las enfermedades gastrointestinales. Alivia inflamación del estómago, gastritis crónica, úlcera gástrica y dolor gástrico. También limpia el estómago.

(Fuente: <https://ecoosfera.com/2014/06/conoce-las-bondades-medicinales-del-cuachalalate/>)